AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE
CHARENTE-MARITIME
DEUX-SÈVRES

RÉCOLTE D'ÉTÉ 2021 : DES PRODUCTIONS MITIGÉES A CAUSE D'UNE ANNÉE CLIMATIQUE CAPRICIEUSE

Les implantations de colza marquent toujours le début d'une nouvelle campagne culturale, celle-ci commence avec des dates d'implantation bien plus précoce qu'à l'habitude dans l'optique d'éviter les attaques d'altises à la fin septembre. Les semis seront étalés entre le 01 août et le 15 septembre (pour les retardataires), avec la majorité des semis se déroulant la semaine du 15 août grâce à une pluviométrie suffisante pour faire lever les semis. La levée est rapide et homogène avant de subir un mois de septembre chaud et peu humide. Des attaques de taupins et de vers gris sont à signaler, les attaques d'altises restent pour la seconde année consécutive très timide.

Le mois d'octobre pluvieux permettra de réaliser des faux-semis en très bonnes conditions, une petite première vague de semis des céréales d'hiver (lin et blé tendre) se déroulera autour du 15 octobre. Le retour de la pluie sur la dernière décade d'octobre arrêtera les chantiers avant qu'ils ne reprennent de plus belle autour du 25 octobre puis entre 05 et 25 novembre (orge d'hiver, blé dur, blé tendre) grâce à un mois de novembre « estival ». Sur colza, le charançon du bourgeon terminal est bien présent.
Avec la chaleur de novembre, les pucerons sont bien présents. Deux insecticides seront à réaliser pour les semis de la mi-octobre à cause d'un développement des stades trop rapides, un seul sera à réaliser pour les semis de novembre.

Décembre est un mois très pluvieux, ennoyant les parcelles de marais ainsi que les fonds de vallée avec saturation des sols. Janvier est plus froid qu'à l'habitude permettant au colza de stopper sa végétation et de perdre en biomasse malgré de l'élongation bien présente. Les parcelles d'orge de printemps seront terminées de semer et les premières parcelles de pois débuteront.

Les 15 premiers jours de février sont doux et humide sur le département, ce qui permettra quand de valoriser le 1er apport d'azote sur céréales et colza quand l'apport a pu être réalisé en bonnes conditions. La douceur ambiante permet au colza une reprise et une croissance rapide, la gestion du charançon de la tige est difficile au vu des conditions climatiques. La majorité des pois de printemps se sèmeront sur la dernière décade de février « estivale » elle aussi.

Mars sera extrêmement sec avec du vent de nord-est et des températures fraîches. Il y aura des averses pluvieuses en faible quantité uniquement à la mi-mars qui rendront compliquer la bonne gestion de la fertilisation azotée des cultures au vu de la durée de la sécheresse qui va suivre jusqu'à la fin du mois d'avril. Les pois de printemps subiront difficilement ces conditions climatiques extrêmes.

Durant 2 semaines en avril, des gelées seront présentes mais n'impacteront pas les orges d'hiver en avance de stade ni les blés tendres et blés durs à des stades encore non sensibles (entre 2 et 3 nœuds).

Après 55 jours sans pluie, la pluie fera son retour à partir du 05 mai dans une relative fraîcheur durant tout le mois permettant aux composantes de fin de cycle (PMG) de limiter une perte pouvant être encore plus importante. La luminosité est très faible durant tout le mois et certains matins affichent des températures en-dessous de 4 °C entraînant certainement des défauts de fécondation des épis. En colza, la pression pucerons est plus soutenue qu'à l'habitude et des interventions devront être réalisées.

Début juin sera extrêmement chaud durant une dizaine de jours, avortant la floraison des pois qui se remettaient (grâce au mois mai) de la sécheresse printanière. Des orages de grêle détruisant des parcelles sont aussi à signaler durant cette période. La dernière décade du mois sera très pluvieuse avec des températures froides tout comme le mois de juillet.

Les moissons débutent donc timidement autour du 20-25 juin avec les orges d'hiver et les colzas d'hiver. Les cultures arriveront toutes à maturité en même temps et le mauvais temps complexifiera la récolte allongeant les délais (re-salissement des parcelles) et impactant surtout la qualité des blés durs d'hiver. Les rendements sont excellents pour les colzas d'hiver ayant profité d'un rayonnement à son maximum durant la floraison de mars à avril, les orges d'hiver sont dans la moyenne tandis que les autres cultures sont médiocres à très mauvais. Les PS sont faibles majoritairement, les protéines sont très élevées et pour les blés durs, de la germination a débuté dégradant les taux de Hagberg.

Gwendal Chollet

températures à Saintes - campagne 2020/2021 données par décade



Pluviométrie à Saintes - campagne 2020/2021 données par décade



graphes réalisés par la CA17 - données Météo France


Evolution théorique de la RU à SAINTES 2021
RU70 mm
RDU
120
100
80
60
40
20
0
11-mars
21-mars
31-mars
10-avr.
20-avr.
30-avr.
10-mai
20-mai
30-mai
9-juin
19-juin
29-juin


Cumul de rayonnement sur la période 10 Avril 20 Juin
Rg en MJ/m²
4eme quintile = 1471
médiane = 1402
1er quintile = 1324
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021